

# Ampicilina Panavet®

Reg. Q-0296-092  
Reg. Q-0296-093

ISO 9001

Polvo con diluyente para solución inyectable

## Ampicilina sódica

### Fórmula

Cada presentación contiene:

Ampicilina Panavet® 250 mg	
Ampicilina sódica (equivalente a de Ampicilina base)	250 mg
Diluyente	2 ml
Ampicilina Panavet® 500 mg	
Ampicilina sódica (equivalente a de Ampicilina base)	500 mg
Diluyente	2 ml
Ampicilina Panavet® 1 g	
Ampicilina sódica (equivalente a de Ampicilina base)	1 g
Diluyente	4 ml

### Especies en las que está indicado su uso y prescripción

*Bovinos productores de carne y leche, equinos, lepóridos, caninos y felinos domésticos:* Eficaz en infecciones causadas por *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Escherichia spp.*, *Klebsiella spp.*, *Shigella spp.*, *Salmonella spp.*, *Proteus spp.*, *Pasteurella spp.*, entre otros.

Tratamiento de infecciones de origen bacteriano sistémicas (ántrax, artritis infecciosas, septicemia), respiratorias (bronquitis infecciosa), gastrointestinales (colibacilosis, salmonelosis), dermatológicas (abscesos, erisipelosis, gabarro), del tracto urinario (cistitis infecciosa) y reproductor (metritis infecciosa) entre otras susceptible a la Ampicilina.

### Administración y Dosis

Vía IM profunda, IV y SC.

## Antibióticos

Dosis sugerida:

Especies	Dosis	
	Concentración	ml
Lepóridos, caninos y felinos domésticos	250 mg	1 ml/ 10 kg p.v.
Bovinos productores de carne y leche, equinos	500 mg ó 1 g	1 ml/ 25 kg p.v.

La misma dosis debe repetirse cada 12 horas o menos de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

La duración sugerida del tratamiento es de 3 a 5 días continuos.

Kg por presentación:

Especie	Presentación	# kg p.v. por presentación
Lepóridos, caninos y felinos domésticos	250 mg	20 kg p.v.
Bovinos productores de carne y leche, equinos	500 mg	50 kg p.v.
	1 g	100 kg p.v.

### Propiedades farmacológicas

**Ampicilina Panavet®** es una aminopenicilina semisintética bactericida de amplio espectro. La Ampicilina es, además, bactericida, ácido estable y de fácil difusión.

Al igual que otras penicilinas es inactivada en presencia de  $\beta$ -lactamasas.

La Ampicilina se une ~20% a proteínas plasmáticas por lo que tiene una alta biodisponibilidad y rápida acción.

El 20% de la Ampicilina es metabolizada y el resto excretada sin cambio alguno. El primer porcentaje puede generar metabólicos que produzcan hipersensibilidad.

**Ampicilina Panavet®** es eficaz contra bacterias Gram + y Gram - asociadas a procesos infecciosos sistémicos y locales. Su efectividad clínica y fácil absorción le hacen un medicamento de primera elección en Medicina Veterinaria para el tratamiento de diversas infecciones respiratorias, gastrointestinales y urogenitales.

### Efectos secundarios y advertencias

Como cualquier otra penicilina, este producto puede inducir reacción alérgica.

Es importante tener el peso exacto del paciente para evitar una sub o sobredosificación.

La sobredosificación y/o el uso prolongado de las penicilinas pueden derivar en una superinfección.

Ampicilina Panavet®

**PANAVET®**  
Salud Animal



## Uso en gestación, lactación o parto

El uso de este producto durante la gestación debe ser de acuerdo a la evaluación riesgo/ beneficio del Médico Veterinario responsable.

## Contraindicaciones

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a las penicilinas.

No mezclar con otros medicamentos ni productos.

## Tiempo de retiro

Carne: 25 días.

Leche: 96 horas.

## Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación

Al realizar la mezcla, agítese bien hasta homogeneizar completamente la suspensión antes de administrar.

Una vez realizada la mezcla, administrar inmediatamente y desechar sobrante.

El producto no aumenta su estabilidad en refrigeración.

## Presentación

Polvo para suspensión inyectable.

### Ampicilina Panavet® 250 mg

- Frasco con polvo + Frasco con 2 ml diluyente.

### Ampicilina Panavet® 500 mg

- Frasco con polvo + Frasco con 2 ml diluyente.

### Ampicilina Panavet® 1 g

- Frasco con polvo + Frasco con 4 ml diluyente.

Uso veterinario.

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica.

Manténgase en un lugar fresco y seco.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

No administrar este producto en equinos para consumo humano.

No superar la dosis recomendada.

Proteger de la luz solar.

panavet@panavet.com.mx

panavet.com.mx

(+52) 442 309 5700

Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres #107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. México. C.P. 76139

